

**Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Patientin, lieber Patient!**


Dieser Auszug aus der PROLIA® Packungsbeilage dient als Hilfestellung.
Bitte lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält weitere, wichtige Informationen.

PROLIA® wird unter anderem angewendet **zur Behandlung von Osteoporose** bei Frauen nach der Menopause (postmenopausal) und Männern mit erhöhtem Risiko für Frakturen (Knochenbrüche) zur Verminderung des Risikos von Knochenbrüchen der Wirbelsäule, Knochenbrüchen außerhalb der Wirbelsäule sowie Hüftfrakturen.

Die **empfohlene Dosis ist eine 60 mg-Fertigspritze einmal alle 6 Monate** als einzelne Injektion **unter die Haut** (subkutan) angewendet.

Die besten **Stellen für die Injektion** sind die **Vorderseiten der Oberschenkel und die Bauchregion**. Eine Pflegeperson kann auch die Rückseite der Oberarme verwenden.


Der behandelnde Arzt kann entscheiden, ob PROLIA® entweder von der Patientin/dem Patienten selbst oder von einer Pflegeperson injiziert werden soll. Der behandelnde Arzt oder das medizinische Fachpersonal wird der Patientin/dem Patienten oder der Pflegeperson zeigen, wie PROLIA® anzuwenden ist. Für Hinweise, wie PROLIA® gespritzt wird, lesen Sie bitte den Abschnitt am Ende der Packungsbeilage.




Einleitung

PROLIA® ist eine klare, farblose bis leicht gelbliche Injektionslösung in einer gebrauchsfertigen Fertigspritze mit einem Nadelschutz.

Bevor Sie mit der Injektion beginnen:




- 1. Lesen** Sie die gesamte **Packungsbeilage** sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen.
- Für eine angenehmere Injektion setzen Sie die Fertigspritze vor der Injektion für etwa **30 Minuten Raumtemperatur** aus.
- Legen Sie die neue Fertigspritze und die anderen in der Packungsbeilage beschriebenen Gegenstände auf eine **saubere, gut beleuchtete Arbeitsfläche**.




1.
 - Ziehen Sie die graue Nadelschutzkappe vorsichtig und gerade ab, weg von Ihrem Körper.
 - Drücken Sie die Injektionsstelle zusammen, um eine feste Oberfläche zu erzeugen.

WICHTIG: Halten Sie die Haut während der Injektion zusammengedrückt.



2.
 - Die Haut zusammengedrückt halten. **STECHEN** Sie die Nadel in die Haut.
 - **DRÜCKEN** Sie den Kolben langsam und mit gleichmäßigem Druck, bis Sie ein „Klick“ spüren oder hören. Drücken Sie nach dem Klick vollständig durch.

WICHTIG: Nach dem „Klick“ vollständig durchdrücken, um Ihre gesamte Dosis abzugeben.



3.
 - **LÖSEN** Sie Ihren Daumen vom Kolben. Anschließend **HEBEN** Sie die Spritze von der Haut ab.

Nach dem Loslassen des Kolbens wird der Nadelschutz der Fertigspritze die Injektionsnadel sicher umschließen.



Entsorgen Sie die gebrauchte Fertigspritze und andere Materialien in einem durchstichsicheren Behälter (nicht enthalten).

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall.

Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline:

Montag – Donnerstag: 8.30 – 17 Uhr

Freitag: 8.30 – 13 Uhr

Telefonnummer: +43 1 502 17